

دندانپزشکی

آبان

مراقبتهاي پس از درمان
Care after treatment

RCT


درمان ريشه

درمان ریشه

معرفی درمان



پالپ یا مغز دندان، منطقه‌ای نرم در مرکز دندان می‌باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارند. وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد، دندانپزشک برای نجات دندان، اقدام به درمان ریشه (عصب‌کشی) می‌نماید. دندانپزشک با استفاده از تزریق موضعی دندان را بی‌حس کرده، پوسیدگی تاج دندان را بر می‌دارد. با استفاده از میله‌های بسیار باریک به نام فایل عصب و عروق خونی ریشه خارج شده، دیواره کanal ریشه، سوهان زده می‌شود تا هم باقیمانده بافت عصب خارج شود و هم کanal دندان وسیع‌تر گردد؛ سپس کanal ریشه شستشو داده می‌شود. پس از خشک کردن، کanal ریشه با مواد مخصوص (گوتا) کاملاً پر می‌شود و تاج دندان بازسازی می‌شود. چون معمولاً قسمت زیادی از تاج از بین رفته است، سعی می‌شود با استفاده از پست‌های مخصوص استحکام تاج بیشتر شود.



مراقبتها و ملاحظات

- تا ۲ ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری کنید.
- تا ۲۴ ساعت از طرف مقابل برای خوردن غذا استفاده کنید.
- آنتی بیوتیک و داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.
- چون دندان عصب کشی شده ترد و شکننده است، دندان باید روکش شود. قبل از روکش با احتیاط از دندان استفاده کنید.
- بخاطر داشته باشید بطور کلی همیشه درصدی شکست درمان در همه درمانهای پزشکی وجود دارد که این درصد بدلیل شرایط خاص این بیماری تقریباً بالا است.
- به همراه درمان ریشه و ایجاد التهاب در اطراف ریشه دندان، شاهد وجود درد متعاقب قرار گرفتن دندان‌ها بر روی هم و یا درد خودبخود هستیم. این علامت طبیعی بوده و پس از گذشت مدت زمانی بہبود می‌یابد. استفاده از ضد التهاب‌ها و مسكن به دنبال درمان روت کانال توصیه می‌گردد.

اقدامات لازم	عوارض احتمالی
برای کوتاه کردن پرکردگی به مطب مراجعه کنید.	احساس برآمدگی دندان
ممکن است تا یک ماه ادامه یابد از مسکن استفاده کنید.	درد دندان
استفاده از آنتی بیوپتیک تجویز شده	عفونت دندان
گذاشتن روکش حداکثر یک ماه پس از درمان ریشه	شکستگی تاج
در صورت تداوم ، به مطب مراجعه کنید.	درد

خیابان کاشان، رویروی مجتمع شهاب، کوچه نسیم
دکتر سید محسن دعایی
www.abandentistry.ir