

دندانپزشکی

آبان


مراقبتهاي پس از درمان
Care after treatment

Extraction

کشیدن دندان

کشیدن دندان

معرفی درمان



در گذشته علاج دندان درد را کشیدن دندان می‌دانستند، ولی علم جدید دندانپزشکی نه تنها کشیدن دندان را آخرین راه حل نمیداند بلکه تلاش و پیگیری در پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان دارد.

دندانپزشک با ترزیق بیحسی موضعی، دندان و ناحیه اطراف آن را بی حس کرده، سپس با تکنیک ویژه‌ای سعی می‌کند با کمترین عوارض ریشه دندان را از حفره خارج کرده، بعد از رها شدن دندان از استخوان تا حد امکان با کمترین صدمه به بافت‌های اطراف، دندان را خارج کند.



مراقبتها و ملاحظات

- گاز استریل گذاشته شده بر روی ناحیه دندان کشیده شده را حداقل نیم ساعت با فشار ملایم در دهان نگه دارید.
- از ریختن آب دهان خودداری کنید و مک نزنید.
- برای نوشیدن مایعات از نی استفاده نکنید. زیرا مکش ایجاد شده احتمال خونریزی را زیاد میکند.
- از روز دوم دهان خود را با دهان شویه و یا با آب نمک رقیق (یک لیوان آب ولرم و نصف قاشق چایخوری نمک) چند بار در روز به آرامی شستشو دهید.
- بدلیل وجود بیحسی گونه و زبان، ۳ تا ۴ ساعت پس از کشیدن مواطن باید لب، گونه و زبان را گاز نگیرید.
- از غذاها و مایعات نرم و خنک استفاده کنید.
- روز اول دوش آب گرم نگیرید.
- حتی الامکان تا ۳ روز سیگار نکشید.
- مدت التیام زخم در افراد مختلف تفاوت دارد، بهبودی خود را با دیگران مقایسه نکنید.
- در صورت ایجاد درد شدید ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد از کشیدن حتماً با مطب تماس گرفته و مراجعه کنید. احتمال عدم تشکیل لخته خون در محل کشیدن و ایجاد "حفره خشک" وجود دارد.
- در صورتی که بعد از تعویض گاز استریل اول، خونریزی همچنان ادامه داشت از شستشوی دهان خودداری کرده و فقط یک عدد گاز دیگر را در محل دندان کشیده شده قرار داده و به مدت ۲۰ دقیقه به آرامی فشار دهید؛ در صورت لزوم این کار را

اقدامات لازم

عوارض احتمالی

طبیعی است.

خونابه

طبیعی است. از مسکن استفاده کنید.

درد خفیف

طبیعی است بعد از چند روز بر طرف میگردد.

بوی نامطبوع
دهان بد طعم
خونابه و وجود قشر
خاکستری بر روی زخم

به مطب مراجعه کنید.

درد و تب و لرز شدید

به مطب مراجعه کنید.

تورم شدید و خونریزی مکرر

خیابان کاشان، رویروی مجتمع شهاب، کوچه نیم
دکتر سید محسن دعایی
www.abandentistry.ir
۰۹۱۳۵۱۲۰۰۵۰ - ۰۵۱ ۴۵۵۰ - ۶۲۹